






Programmi di alimentazione per scrofe in gestazione

- 1) **La condizione ideale della scrofa è BCS 3** con almeno 15 mm di spessore del lardo dorsale.
- 2) Scrofe fuori forma possono essere sovralimentate nel I° terzo di gravidanza e, con cautela, anche nel II°.
- 3) Sovralimentare per un recupero della forma non può prescindere da un'attenta valutazione della condizione corporea (P2) poiché l'ingrassamento avrà una ripercussione negativa sull'assunzione di alimento nella successiva lattazione.
- 4) Dopo i 75 giorni di gestazione crescono le necessità nutritive per lo sviluppo della mammella, la crescita fetale ed i relativi annessi. Sono per lo più necessità plastiche (proteine, aminoacidi...) per cui un eccesso di energia si tradurrà in un deposito di grasso a scapito del tessuto secretorio del latte.
- 5) Durante tutto il periodo di gestazione prosegue il processo di crescita materna fino al 4° parto, il fenomeno è più importante nelle scrofette (second parity sow syndrome).

BODY CONDITION SCORING					
Image					
Score	1	2	3	4	5
Condition	Emaciated	Thin	Ideal	Fat	Obese
Detection of Ribs, Back Bone, "H" Bones and Pin Bones	Obvious	Easily detected with pressure	Barely felt with firm pressure	None	None

Taken from "Assessing Sow Body Condition" by R.D.Coffey, G.R. Parker, and K.M. Laurent (ASC-158; 1999)